名家方德 目錄	中恩一天	外因病一八	脫肛		→疳陰囊病	······································		1	◇腹痛九		上部雜疾八	口舌牙齒鼻耳眼四	爲刀瘰癧四	咳嗽喘急1	髋胃吐食膈噎	頭痛—	上部病—————————————————————————————————
	婦女病三三	桑 風·····	結賽二八	廢痼病二八	雜瘡一四	黴瘡⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	雅疗	猪腫病	水建	水飲病	 	虚勢IO	內因病	痢疾⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯		羞———————————————————————————————————	痛風一九

鑫症,四一	五疳三九	小兒病三九	帶入維疾······三九	妊娠產後病諸症三六	婧嗣野下······三四│ 為思之勢	型羽如薜
	雜集方	解毒方如八	小兒雜病四六	胎毒雜矯四五	急慢骛風四五	<u> </u>

續名家方選目錄

商名家方进 目錄	下疳瘡・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・七二		疝疫腰腹痛	下部病六九	心腹痛六七	中部病六七	上部雜疾	膈噎反胃六四	喘急咳嗽六二	塪喉	牙齒六一	口舌五九	<u> </u>	鼻五五	耳五四	頭面五四	上部病五四
	水踵八五	水飲病八五	黄胖八四	血體八三	産勢八二	內因病八二	<u> </u>	泄瀉八一	新·······八一	蹇八〇	歷節痛風北七九	中風七八	外因病七八	下部雜疾七八	遺緣七七	殷肛七六	痔北…七三

缝名家方题 目舞

٠.

類病九二	癲癇九一	極屋九〇	廢痼疾九○	雜霑	徽 瘡	疥癬八六	雅疗八六	霑耀病八六
雜集方······ ○	解毒方一〇〇	雅症	小兒病	乳病			經閉血療九三	婦人病九三

名家方選

上部病

【頭痛】

姜黄湯 沿諸頭項痛引肩背者甚妙.

樱皮 防風 獨活给五 甘草一分 桂枝

在七味水煎服 姜黄珍三

石亭丸 治頭痛諸藥不效者

硫黃三十 硝石針五 百草霜五發

出於本事方無百草霜今加之有經驗 右三味爲末糊丸梧子大每服自五丸至一錢五分冷茶送下原方

拾濕家頭痛方

令病人含水半盏許瓜蒂末少許貯小竹管吹入鼻中

【飜胃吐食膈噎】

恰反胃吐食及膈噎方

上鄉病

机青

茯苓谷等

右二味水煎頓服甚駁

拾膈噎方

松寄生靈華扶等各等 甘草咸半

右三味水煎頓服

始同症 蠻方

巴且杏 鳳尾草路一冰糖

右四味細末蜜丸白陽线下神效 甘草品五

【咳嗽喘急】

拾久咳嗽神方

生款冬

射干

蘇子

杏仁 右六味水煎頓服 伏龍肝谷等

給小兒久咳方

鷓鴣菜

右三味水煎服無用取白刀豆數枚投於熱灰中去皮爲末白傷攪 甘草谷

調服之若不已者服紫圓五六粒可。

半夏

茯苓

桔梗

馬兜鈴塔 黄芩 甘草少年

貝母

右七味水煎分服

冶喘桶欲死者方

腿鼠霜 辰砂 杜攀谷

右三味為末白湯送下神效

治咳嗽痰喘 不得臥者

細辛四分類 枯梗五穀 川芎三量 麝香五葉

皂莢五分

甘草四分

龍腦五分

右八味爲末蜜丸白湯送下。

寫近湯 治咳逆倚息不能臥衆治不驗者 乾姜 蘇子谷七 华夏 杏仁

桂枝至五 山椒二分

在大味作一劑以水一合大勺煮取人勺去燁內白砂糖五錢煉如

蛤每日三服

恰喘息或痰喘哮吼方

桂枝 香蕈一般 香附子 甘草

乾姜

蜀羊泉

粳米寒器

南屬葉海

丁香二分 葛粉一分

右十味爲末白湯送下。

紫金丹 砒霜一致或代豆豉 冶喘息

上部病

枯蓉等三

Ξ

黑屎通為知 右三味為末糊丸梧子大朱砂爲衣每服五丸冷茶或冷水送下以

[馬刀瘰癧]

夏枯草锡 治療癧馬刀不問已潰未潰用此方神效。 夏枯草三城大黄三分 甘草二分

右三味水煎頓服

題氣道而或有痊者

連翹場

荆芥 連翹 川芎 薄荷金等 黄芩 甘草

右七味水煎溫服

治療療結核方

徐瓜黑霜一

右溫酒送下。日三服

口舌牙齒鼻耳眼】

治口中燥裂齒痛方 蘆薈 没藥

阿仙藥

黄柏等

亨按此病多因氣分而發最難治故雖實膿汁快不出但出黃汁而 已宜節食肉物飲醇酒然則營衞血氣能調和於是用此藥則能疏

治療歷堅硬者不分新久大小服之至妙。

世确

人中白旗牛

右五味爲極末先以煉蜜濤處掺之若齒根動者加鹽梅苦萵莖各

爲霜擦之

拾舌疽神方

水苦蕒 生昆布等分解

黄連炸

右三味塗瘡上日三夜二

甘遂率牛子丸 给上部警熱諸疾齲齒者

甘遂 牽牛子 大黄粉

右三味爲末糊丸梧子大白湯送下

始齲齒方

莎草根 烏藥學

右二味水煎須臾含之而飲之

治鼻中瘡方

琥珀油

右一味內鼻中日五六次

又方 蠻傳

野菊油蟹名也

右一味和麻油傳之

桔梗^{一錢}

上鄉病

芍藥

甘草品五

五

大

土茯苓二十五歲

右六味分作二十點貼以水二合牛煮取一合牛。每再以水二合煮

取一合服禁五寶丹等之藥

療酒查鼻面赤如天刑病者方

黄連 地黄 紅花路一

甘草少 大黄

萬根

右八味以水四合煮取二合去炸再煎取一合牛日二服

同傳藥方

硫黃

乳香

巴豆硷

輕粉少

右四味和与煉蜜傳之 煎傷候其大發熱乃止之是毒盡之應也若不覺者難治 亨嘗用此方。初服锡後數日覺患處或痒或痛者乃傳此藥,且倍服

草席子丸 冶耳聾奇劑也

遠志 磁石研細水和乳香鎮二 建蜗上角 电角景致度 生地龍中華 全蝎上角

右七味為末以黄蠟熔和為丸塞耳中

燒酒一升 麝香三發 茴香三餐 葱白素三青蒜 達路散 治耳聾妙方生質耳聾者與五旬有餘聲啞者難給

右四味調合入硝子壺內密封暵日曝凡三旬而取出應布去滓以

竹管吹入耳中日十五六次兼宜服丸藥然後或刺尺鐸出血

丸藥方 硫黄一甲 煙硝一級

右二味爲末先設二磁器一磁器入小砂石上火一磁器約末子覆 藥煙氣昇開蓋少權冷水一二熵更覆蓋後下火置於冷地上一時 令氣不泄而置於砂石磁器上微火燒之須臾令火氣徹於末于候

許取出糊え

治骨槽風方 升麻 桑白 黄芪

甘草经五

芍藥路一 右七味水煎廣東人參末日一錢五分介爲三以煎錫送下 茯苓 黄檗経四 巴豆豆

兼用丸藥方 右四味爲末糊丸臨臥服三分 大黄 青黛

亨嘗試此方用人參平脈多見滑大者此爲知若不滑大則倍用人

参以取験

爐甘石散 酱眼病通治之方也

爐甘石四錄 黃蘗 右五味先內爐甘石漢土於土器中燒之华日次黃蘗黃連莽草以 水二合半煎取七勺浸爐甘石漢土上微火候囿數浸煎汁更上微 火以煎汁盡土石乾移內器物磨之半日許爲細末和煉蜜復磨之 黄連一級 莽草六枚 **熯土**五分

芣苡陽 半時許收貯而或作丸或作錠磨水點之眼中極效。 治上衝眼中有血或生醫或失明者

車前子二級 細辛 黄連

黄芩

甘草谷六 茯苓三分

右七味水煎頓服

内障散 治內障之靈方.

代赭石三分滑石五分 石膏

右五味爲末網包之投熱湯日洗五六次

拾麈埃砂石入眼疼痛不可忍者方

山茶花士篇 鼠牡子馬精

右二味爲末服二三上妙。

【上部雑疾】

辛夷散 冶諸毒氣攻上部者

川芎蜂

大黄

荆芥

辛夷

防風餐三 甘草三

雄黄解毒丸 治纏喉急口痺 雄黄一丽 右大味細末溫酒送下

右三味細末糊丸梧子大日服一錢 **●金一**後 巴三豆十四

朱砂纸

爐甘石

'n

冶肺癰方

三味寫白散加樺皮甚妙

毛莧繁+ 龍葵-曼治婦人妻赤方

右五味爲末納布囊潰水爲梳水。 沒石子

青鹽少幹

中部病

【心腹痛】

寫牌湯 治積氣心腹痛者 茯苓

在主味水煎服 有主味水煎服 在主味水煎服 有主味水煎服

生姜丸

黄芩

甘草三分 枳敷四分 厚朴六分 转藥二分 桂枝 茯苓各六綏中湯 治積氣腹中拘急者

右七味水煎服或加大黄六分

亨云前方出於千金翼後方出於肘后方此二方雖不出禁祕屢以

有經驗編入於此

征蟲丸 治腹痛或氣修胸中窒者

九

人參三分

胡黃遠 苦養各十 楊梅皮二十黃蘗十發

黄連 反鼻霜少許或代

右七味爲末糊丸白湯下

黑丸子古方 拾積氣蟲癖及心腹痛

黃連四級

熊胆三競

右五味細末糊丸以熊胆爲衣白場下。

同今方

莪朮五錢 合數四級 木香二號 黃連三級

右先細末四味糊丸乃以熊胆爲衣白陽送下。

兼术 莎草根蜂三白术三、生姜順氣丸 凡積聚疝瘕恶苦味者代黑丸用 莎草根終三白水二量 生姜一般

木香五號

右五味爲末糊丸白湯下。

桂苓散 治動悸諸藥不效者

桂心蜂 甘草五蜂

當歸計五 干姜

右大味為散每服一錢日二夜一白傷送下

松脂七萬 大黃三城 松脂丸 给心下痞鞕大便秘結者

大黄三號

右二味爲末糊丸白陽送下

0

清中飲 給不問男女癖塊時時妨逼心下鬱冒心悶爲狂態者

草三稜路一

右二味水煎日服二劑或三劑四五十日而知百日痊婦人加蒲黄

七分益可也

鼈甲場 **給辦塊腹滿寒熱**

桃仁二分 虎杖一錢 大黄三分

右四味水煎日服二劑血塊穢物當從大便下

拾腹痛時時發則嘔吐方

樟腦

右一味水煎溫服之

五靈脂二級 莪朮一級 **治瘀血腹痛**

當歸十段

右五味爲末每服五分酷送下

玄胡索

良姜岭入

下部病

【疝瘕】

茴香圓 冶疝腹腰腹痛或引囊及囊大者

鹿角霜 五兩 茴香二兩 胡椒一品

右三味為末糊丸

下邮崩

烂疝氣钱頃腰腹弦急不能搖者方 甘草五分

綿實仁五分

右二味水煎頓服

【脚氣】

七味檳椰湯 **始脚氣疏通之劑也**

桂枝三分

檳榔一袋 大黄

甘草

积實品五

橘皮

生姜蜂三

右七味水煎服

桑白

鳥頭

鳥頭場 治脚氣遇身供腫者 檳榔等一

商陸三線 生姜七分

右大味以水三合先煮鳥頭減一合內諸藥煮取一合日三貼

黑豆五錢 大黄八分 檳榔一锅豆湯 沿脚氣上冲

右三味以水三合先煮黑豆取二合去碎入諸藥再煮一合分服

沉香散 胎脚氣氣急毒攻者

打草一数 實界 沉香上品 香附 檳榔水五

鹽

宿砂五分

右七味水煎去煙內檳榔鹽攪調分溫服

迎衝飲 治脚氣氣急上衝心欲死者

檳榔素二 生姜汁五分 童便二合

右三味攪調頓服

如神丸 沿脚氣腫滿氣衝心氣急不可忍者 芫花

虚實增減之頗利水則佳勿大脞下。右四味。細末稀糊丸語子大每服五分或一錢空心姜陽送下宜隨花 甘草 大戟路五 大黄三分

機石 五級 H

芍藥 甘草分五

右三味水煎洗脚妙或少加鹽亦佳

松葉酒 治脚氣手足不仁或學急及風濕身體疼痛不已者 松葉三義 鳥頭 羌活路一

右三味以好酒一升演之七宿日盡一合

【淋疾便毒下疳陰囊病】

小解毒場 治氣結內狀疾小便雖下膿血者 山歸來三 滑石 澤嶌 阿膠

茯苓

忍冬五種 大黃三歲

右入味水煎服此方解毒利水功相無米家應用之方也

治林疾疼痛甚者方

不發病

村里 大黄二g 大黄二g 大黄二g 大黄二g 在二味水煎服 甘草三致

附子一卷

雄黄

大黄

海金砂谷

在三味細末白傷送下。

始琳奇方

桂枝湯加蘇鐵葉為末欖調送下最妙

甜瓜皮蚕 甘草一

右二味水煎服 亨嘗試之治膿淋最妙。

山茶花二級歲三級 右五味水煎服

芒硝络五

右一味爲末酒送下

下便毒方

芎藭 大黃

蕎麥名等

右三味為散酒服一錢日三

給便毒寒後核不消方

鹿角三級 上茯三数

當歸

蝮蛇羅二 丁香

腿鼠精

廿草

川芎

大黄品五

紅螺卷三 右十味輕粉燒五分和藥爲末糊丸

傳下疳廢爛方 百藥煎三分輕粉二分

右三味爲末和黃蜀葵汁溫陽洗患處後擦之

下疳膏 下疳通治之奇膏也

黄柏 猪膏分華 輕粉少

右三味和煉而傅惠處

單杉散 治疳瘡痛甚忌油蠟者杉一味細末和鷄子傳患處

治陰囊溫痒方

麻黃根 牡蠣

右四蛛為末擦患處

乾姜

蛇床子给

下部病

治些丸發方

川鳥頭 揚花 大黄

右四味爲末以燒酎煉之以紙封固一夜而取出醋和之敷患處此

方又治芥癬至妙

華麻子ル 胡椒

黄連分等

右三味為末和醋敷惠處

【濂瘡】

右二味爲末和敷患處

大黄

烏頭路

治廳瘡奇方

楊梅皮五分茯苓六分桔梗七章 甘草五產

合煮前滓減日倍一勺至五勺服法如前至三劑而止當時無驗者 右四味剉以水一合煮取九勺日三夜二溫服盡五日間每以水一

明年不再發也

終瓜^{衣熟者}一天石一般 治臟瘡連年發不痊方

右六味爲末取豆腐牛枚和煉之貼患處破之七日則愈

滑石

與群血路一朱砂五分

服藥方

甘草 大黄 古七味水煎頓服工草 山梔子等 蒼朮 陳皮 白朮粉入

又方

荆防敗毒散加雁來紅水煎服最妙

【痔漏脫肛】

沿涛偏方

荆芥 盘。 在四味水煎鹿胎子霜二十錢分爲七臨臥攪煎錫送下凡七日服 好, 槐寶 地黃終 大黃玉寶

同洗方

木天蓼 木綿實等十

右二味煎汁洗腰下最妙

同傅藥方

蚯蚓油 蜗牛油

杉脂油

琥珀油

右四味調和傅惠處

胡黃連追毒丸。治痔漏不拘遠近有漏通肠污物從孔出先用此方追

膿血。

胡黃違

下部病

刺蝟皮品一島香三分

七七

右三味爲末陳米爛飯爲丸麻子大每服一錢食前溫酒送下服後 慶水益多者是藥之應也勿恐矣候膿水盡宜用胡黃連閉管丸

胡黄連閉管丸方

胡黃連五聲穿山甲

右四味爲末蜜丸麻子大晨昏各一服米湯飲下重者四十日而愈黃蓮玉。穿山甲 石決明 槐花牛蜂 如漏之四邊硬肉突起蠶繭二十枚炒爲末和入藥中凡治遍身諸

編皆效

薰痔法

取馬屎溫而蒸之

外因病

【中風】

試癱瘓中風蹇不瘥方

無應子生

右一味以水二合华煮一合分服

亨嘗云凡見癱瘓中風一證則用此傷而得大便溏者可治否則難

拾.

沿偏枯方

茯苓

莪朮谷五

青皮

烏藥

附子 右八味水煎服無用一粒金丹妙 大黄焰三 甘草二分

【痛風】

华藤至元章 甘草五分 沿屬風方 治劇症

士骨皮三维 羌活九強 芍藥 川芎蜂二

右九味分爲七劑七日服盡

又方 治易症

濱防風 川芎

羌活

右三味水煎服

【瘧】

截瘧方

山椒三五

梨竇

椒目一致 厚朴八分

右二味以水一合华煮一合頓股

冶瘧母方

外因病

常山

大黄

鼈甲格一

一九

各家方镊

右四味爲末白陽送下

【風疹】

冶陰疹屬熱者

四物湯加荆芥防風山梔各等分。

荆芥锡 治風疹惡寒發熱者

荆芥 麻黄条人 桂枝

右三味水煎溫服

如神丸 治痢疾神方【痢疾】

砂仁

甘草三分

右六味爲末小麥糊丸如梧子大朱砂爲衣

三年酒三合 冰糖六烷治痢疾後重方

右二味投土鍋中以慢火煮合如蛤敷敷服之牛日許而行波職物

大下數日而差

亨按老人小兒元氣虛衰者攻擊已止而宜用此藥寬中也

内因病

乾坤丸 乾牛二十 右四味調和爲末糊丸梧子大每服二十九 治心氣虛勞及勞瘵初發 茯苓 薯蕷餐十大棗四十個

拾勞咳方

石館生

右取一匹入人屎中數日喰人屎而後取出洗流水盛土器蜜封燒 爲末糊丸白湯下O此方能去諸病似勞熟者至妙。

朗明湯 冶遺精久不止盜汗五心煩熱等證

枳實 厚朴品 牡蠣 白术给七

黄連

竹茹

右九味水煎頓服

石膏台三 甘草二分

既欲成勞瘵疑似之問宜用此方兼治蟲積爲麻痩者 良姜谷八 甘草

青皮

华夏 厚朴 烏梅金五

七寶散

右七味水煎溫服

神授丸、勞瘵之症先灸四花患門後宜服此方。

皂角

桃仁

檳榔

雷丸盛 安息香一分 右八味糊丸桃柳葉煎汁送下斷病根

內因病

【黄胖】

黄胖丸 治黄胖上逆動氣或下血眩暈不能行步者. 鐵砂 計煮後 蕨粉袋 硫黄八錢 枯礬二錢

右四味為末糊丸梧子大日一錢或二錢半酒送下

鐵砂五錢 蕎麥十錢 鐵砂五錢

右二味爲散每服五錢日三白揚送下

水飲病

【水腫】

禹水場 又日敦阜劑 治水腫平和而能疏通之劑也

澤寫 茯苓分加 牽牛子如 赤小豆二般 大麥加玉 地庸子社分加

右七味。合四錢八分爲一劑細剉以水三合煮取二合日三夜二服 瓜最妙 〇脇腹痞加縮砂青皮各二分氣不順加木香二分一方加陰干胡

右五味以水三合煮取二合服赤小豆場 冶毒氣內攻水腫氣急者

桂枝五釐 茯苓二錢

琥珀锡 琥珀一般 商陸二級 **始產後水腫及諸血毒生腫者** 桂枝八分 反鼻五分 猪苓七分

右五味水煎分溫服

猪皮生 桑白皮生 白朮膏 给水腫迫胸部者甚效 桑白皮牛袋三

右五味以水二升煮取四合去滓入酒五合更煮取三合令如妮更 瓢肉類末各二黑豆三合

加朮末每服二錢白陽送下

冶水腫神方

西瓜子三發猪白皮一發 商隆三級

右四味以水二合煮取一合牛服

石葦一邊 沉香五分 **始水腫諸藥入口則吐及十日餘不食脈實者** 猪苓谷七

澤寫

右四味水煎服

瘡腫病

【癰疔】

白英散 治癰疔及諸熱毒腫

白英一歲程並業

胡椒養壽 丁子養無君

右三味各等分溫酒飲下每服六分,

水飲病癌腫病

冶癰腫發背方

稀養具篇舞舞選一件各五 和慶哥名處 食鹽店三

右五味研勻充填瘡口知痛者毒後不知者更數次以知爲度

【黴瘡】

甲字丸 治黴瘡毒

黄芩 黄柏

大黄

輕粉金三

鹿角質片

右五味糊丸辰砂焉衣日五分或三分

洗黴瘡痛甚者方 茵蔯五南 精黄一雨

冶黴毒方

右二味煎汁洗之

鹿角霜五該 黃柏三錢

右二味為未分爲七服七日服之每服土茯苓一斤劉細七分之其

梓葉陽 一分以水九合煎取四合煎汁送下散藥 冶黴毒發未發及骨節疼痛者

忍冬婆 大黃

川芎始五

甘草三分

右五味水煎服多服益佳

【雑擔】

如意会囊散治毒腫諸藥不験者

治諸結毒牖瘡不瘳者方 天花粉白寶黃柏 右十味病輕則爲末和醋敷患處以輕紙蓋其上若病重則變煎入 葱白清酒熨患處冷則頻頻換而溫之消腫去毒至妙。 橘子 甘草 白朮 姜黄 白芷蜂三 天南星

金銀花五錢遠志一錢

右二味以水五合煮取三合洗患處日數次

楸葉場 冶瘍腫一切悪毒瘡

秋十五錢運 解木皮十錢 擦皮五錢

右三味以水一升煮取五合分溫五服小便不利加木通三錢

大苦參丸 沿瘡毒

苦參

髮灰

輕粉 霆天益

露房羅 反鼻

乳香谷

雄黄

朱砂 右十味糊丸梧子大日一錢半或二錢白湯送下。

大解毒湯 治癥毒發磨或骨節疼痛或下疳腐爛不問新久難愈者 川芎 通草 忍冬 茯苓等 大黄二分

右六味以水三合煮取二合服

瘡題病

始陽火傷及諸惡瘡方

代赭石

寒水石器八

右三味爲末糊丸以丹爲衣丸梧子大隨症增減丸數

沿疣痔方

枯礬分 莽草五十

右三味水煎洗痔日三次洗自消

土骨皮傷 冶諸毒氣在表將發者 上骨皮 甘草三分 防風

桂枝蜂五

透臘場 治臘巴成而不穿破者破之則潰爛者 黄芪 右七味水煎服 芎藭 當歸 皂角缝

右五味水煎服

拾大人小兒頭瘡方

天花粉四號 輕粉三級 地龍舞

右三味細末和麻油屢傳之

拾無名毒腫方 茜根一般 反鼻五般 右二味水煎溫服

劉寄奴草生葉一味

大黄丝人

穿山甲路.

薏苡≦。 甘草-→

右二味水煎或以二味敷患處

始浸經瘡方

阿仙藥 黄連分

右二味為末和水傅瘡上日三次

療一切血毒疥癬不已者方

楊梅皮二級荆芥五發或

右二味水煎服日二劑或三劑服之〇膘瘡積年不已與此陽結毒 腫脹發庠乾瘡不過三旬而得効

樱茄場 治一切血毒熱腫

医茄 解木皮蟹四楊梅皮一般 忍冬三数

甘草少許

右五味水煎服七日而痊

發疥瘡方 將發之間二三日以酒塗之則盡發 巴豆豆 **萆麻子** 杏仁分等

右三味細研和酒以布包之按患處數次一日而瘡大發而愈

恰瘭疽方

乾柿 白砂糖 味噌等等

右三味為霜細末和水敷息長

糖屋槟

冶灸瘡不愈者

豆腐一味去水和糊貼瘡上

梅肉散 冶諸惡毒

梅肉 右四味細末為散每服方寸上 山極各七分巴豆二分 輕粉

廢痼病

【結毒】

七寶丸 治遠年近日瘡毒痼疾骨節疼痛者

輕粉二級 土茯苓一級 大黃五分

鷄舌香五分

右五味細末糊丸白湯送下。

後方

田田田 鷄舌香給 大黄五分

右三味細末糊丸前方朝夕服八分至大七日亦服續七實丸

續七寶丸、治服七實丸未愈者

水銀三級 佾石 攀石路六 鹽二級

右先碎消石礬石乃合四味內尾盆以磁器覆之以泥封之安架上 而燒之半日許既而取其所屬着磁器霜以棗肉爲丸服之

輕粉丸 冶黴毒痼疾累月積年難愈者

Ξ

牽牛子二級 竹茄一袋 輕粉一錢 梅肉一箇

右四味爲末糊丸茶末爲衣每服三分日三服白傷飲下盡一劑後 服備急圓五分機物當下凡施劑未必盡劑隨病人強羸可權之

冶黴毒諸藥無効骨節疼痛不止方

嚴風幕

右一味溫酒送下。

頭風神方 治瘡毒上攻或輕粉毒攻

草薢十二度 金銀花三歲 防風

辛夷終五

烏頭

玄參

蔓焼子

燈心

細茶谷三

酒煮解毒湯 右十一味水煎頓服

白芷 防風

穿山甲

陳皮隆三 皂角刺

金銀花

没藥

治諸瘡毒經年不愈或骨節疼痛者。

甘草

貝母終五 半服 右十味。合二錢五分爲一劑酒煎日服一劑三日或七日服之煎法 初以酒三合煮取二合再入酒二合煮取一合若不嗜酒者酒水各

沿諸結毒方

地骨皮

忍冬 川芎名等

甘草或华 通草

荆芥

防風

凝想铸

水銀丸 右八味水煎二日服五貼〇若有結毒者骨節疼痛或轉筋者宜用

水銀丸方

硝石 富 蜜蠟爲衣製法勿合失法若犯之則不作丸 右六味先用青鹽棗肉和水銀次內絳礬研相和而不見星英內確 石枯礬相和數磨之若乾枯難作丸者加蜜少許煉馬丸菉豆大眾 青鹽五分 礬石路一 歌 肉 中 所 或 強 小 爾

神社丸 甘丝 冶筋骨疼痛數月不止及瘡癤不差者 芫花 大戟野羊 輕粉分量遊

牽牛子點一

右六味細末糊丸白湯送下

玄直散 治一切痼疾屬瘦虚弱不可與峻劑者

土茯苓六十歲食 右八味細末為二十貼以土茯苓煎汁日服三貼. 黄芪鱼 茯苓蜜 甘草一维 人多苦磨 熟地黄三届生地黄 甘草一號

當歸

感享丸 冶徽毒奇劑 董陸旗之而入禮花韻和

土茯苓五萬 菱数三黄 右五味爲末糊丸每服一分兼用後傷

聚肉粉

胡桃仁 整 輕粉五

右二味以水五合煎取三合溫服禁醋油酒臭物魚鳥

鷄肉膏 拾黴毒疳痼疾之艮劑也

如飴為度用後一兩日乃用後方〇製雞肉法、取鷄一具去羽骨右五味以水三升煮取一升五合去滓内雞肉一具令煮和調而以 皮筋薄剉之漬清酒一宿明旦用之 黄芩 黄連 肉桂醇三

艱藥方

水銀一量 樂四面上下以紙塞之令氣勿洩一面穿小孔令患人含水當鼻而 右四味和調而更和陳艾六分中令分捻而爲七炷猶燈心狀納盡 齅之甚驗 浸香油燈於方燈繁中而齅之每日一炷七日齅盡之齅法 方燈 黑鉛內病黃少許則為黑霜。肉桂五分 甘草二分

鷄肉丸 冶徽毒諸藥不効者

雌鶏一具去羽信石錢五分

之初以文火後以武火須臾下火細末糊丸以搜風解毒傷煎汁每 右二味和調分而爲七納土器七枚固封以鹽泥遏塗器面乃悉燒 日送下一器之藥七日宜盡劑初服二三日病人四肢稍當覺麻痺 醋酒房事等 至六七日全身痿痺縱雖不痿痺者必瞑眩則止後服禁冷物魚鳥

樹木皮二級 夏枯草 班骨皮格三

右三味以水二合煮取一合或加大黄三分

攀金玉 皂角刺一致大黄十岁 白季,再造散 治大風及黴毒不擇新痼服之妙。 白牽牛大數反鼻五鼓

右五味爲末溫酒送下。

東山丸 治結毒經年不愈者

甘草五分

黄連三分 川芎五分 阿仙藥三量大黃 輕粉餐二 竹茹八鐘

右七味爲末糊丸辰砂爲衣

「殿風」

療白癜風方

菊名石经

右三味爲末和醋塗患上

療赤白癜風方

苦參 大黄

川芎

右四味爲末和醋以茄帶擦之甚妙

冶赤白癜風經年難愈者方 稀黃葉 酸漿草盤二硫黄一酸

右四味先擒稀黃酸漿次輕粉硫黃爲細末合構盛網袋擦痒處日

三度奇驗

婦女病

經閉血癖】

通滞散 治經閉帶下或痢後腹中生塊手足痿弱者

香附华地 阿膠炒 反鼻

大黄金

右四味爲末每服一錢日二溫酒送下。

殍石丸 冶血地妙劑也

右三、珠爲末树丸梧子大白易送下。日一錢牛 大黃 浮石谷

琥珀散 消瘀血在腹内爲痛者

鼈甲 大黃金等

琥珀

熨迹血在腹爲痛者方 右三味爲末每服二錢溫酒送下日二

紅花 茴香公等

右三味爲粗末以新布包之潰燒酎中須臾而火溫熨患上日數次

瘀血積年不瘥者用此方則能回宿疾而後用藥則藥能應病也

婦女娲

牽牛子 牛膝 经烘墨路二

子煎湯送下或溫酒送下。 右七味細末糊丸梧子大每服三十丸以半夏紅花桃仁大黄白芥

橋米東省五合硫黄二錢至橋米散 台票 下瘀血塊宜用之

右二味為細末以中條家本味正氣散去人參加牡丹皮好煎傷後

治服糯米瞑眩甚者方 鉛三菱 下藥末日二劑

右一味水煎頓服

延胡索場 冶婦人經閉時腹痛裏急者

延胡索 | 蟻 當歸 右四味水煎日二服長服益佳 桂枝路七

黄漆丸 冶婦人血癖痼瘕積年不痊者。

大黄三维 生体一段 右三味爲末蜜丸白揚送下日三錢 麵粉二級

(崩漏帶下)

腰滯二妙湯 始赤白帶下。或產後腰弱不能步者

京台人 自然是自身是在 毛芨根前胡 一 在五味一一競牛為一種以水三合意取三合牌再以水二合煮取 桑白 萨菜鄉州名 肉桂少

松寄生散三角白華天物別一名正是打三古明三五 黄柏 芍藥

松寄生、盆籍

續斷

重肉名等 生地黄

在十味水煎頓服

乱美第一次是一方法

疾魔髮味噌黑霜二味相和白锡送下之以極驗好附于此 右一味每服一錢日一白湯送下 亨曾治產前產後血氣上遊諸

茅根屬。倫撒下離藥不効者 英雄四级 丁子 肉桂卷一

経過なって

治崩漏查方 右三味水煎頻薰前陰最効

故意的

三十一大味白陽送下.

琥珀丸 治赤白帶下日久者 現拍 木香

麝香谷二 右七味水丸如彈丸大白揚送下 乳香一般 辰砂二分

牡蠣-紫

梔子

右四味水煎服

芍藥含五

甘草三分

又方

乾姜黑炒

芍藥

参金路五

桂枝三分

【姙娠產後病諸症】 右四味水煎服

試姙娠方

大麻稭一味燒爲末

右服五分日二台陽送下用七日而後不見月經者必姓版也否者

伏龍肝·黃 白朮云 治悪阻嘔吐不止者方

猪苓二般

右三味爲末每服自三分至五分日三白揚送下 冶姓版口中熱生瘡者

犀角六分 芍藥七分 右四味水煎服

生地黄八分

芎藭五分

给轉胞方

枇杷實二十 巴豆七分

ヲクリカンキリ 四鏡

右四味先以枇杷實爲末内ラグリカンキリ巴豆田螺合研塗一寸五 田螺者獨去具

分紙貼臍下二寸以小便通爲度劇者尤效

香麻散 俗所謂下枕藥者也

香附子 苧麻

右二味黑霜白陽送下。

拾兒枕痛方

阿膠烊消投胡椒末和攪爲膏乘熱塗少腹頃刻病人覺發熱乃瘥

治產後狂癎方

虎骨

血竭分二

学麻葉一般二分六

柔吾散 右四味爲末白傷送下 治氣逆血暈或痰咳急迫諸與瀉心藥而不効者

阿仙藥二章 辰砂一章

在三味細末白傷送下.

沿產後血量諧症

兔腦散

右一味爲末白陽飲下

拾血量方

好女病

機關毛霜 亂髮舞 右二味細末白陽送下

优隆散 治產後陰門腫痛者

於五倍子

出來明著

學學學學

一時

葱白盆等

右五味水煎屢洗陰門。

楊梅皮海屬衛路一甘草油分 **冶產後熟毒口中應爛不得食者方**

右三昧水煎食前香之初慘痛不可忍二三次必妨

墨母鴉 冶難產奇劑也

芎歸陽倍雲母用之方也

草按凡難產露手足而不出既破水而未娩引二三日者或雙胎

補母湯、治產前產後或金瘡打撲兄從血症變出者。

藿香 董陸 芎藭 沉香 人參 乳香

数忧

桂心

石膏

滑石

當路

伏苓

桔梗

柴胡

木香

芍藥路

黄芪

肉桂

熟地黄

丁子

宿砂

檳榔

大黄 安息香酱三 升麻

一一十七味水煎服 甘草

黄芩

[婦人雑疾]

治乳腫方

取萬年青生汁塗患處神驗

治乳岩遺爛精神日衰者方

釀乳丸 療產後百日間乳汁不通者服此方神験 水蜥蜴生者研令如膏塗患處立令精神爽恍連日益佳

木通葉六級 牡蠣四級 麥門二級

右三味爲細末糊丸如大豆大腩黄爲衣白湯送下船好中亦可服

禁五辛青菜類又嫌他藥弁用

乳風奇方

天花粉

右五味水煎溫服

柴胡

小兒病

【五疳】

千金莫傳方 五疳通给之妙劑也

木香三族 胡黄連路四三稜三段 莪朮

黄柏二丽町 檳榔

哲辛

仙人草

右八味細末糊丸如梧子大隨兒歲數服之一日三四次宜服

小兒癖

三九

午王丸 疳脹通治之藥也

黄柏兔二 香附 資郵人參 莪术 山藥

右九味為末蜜丸如梧子大柏。 香附 檳榔

甘草谷

疳眼兼藥

合數木 車前子名等分

亨按凡類疳眼雀目者用午王丸不愈者兼用此藥即驗此藥先取 小鰻鱺魚不滿尺者燒之魚汁將出則取霜藥粉于魚上乃餌之盆

佳

給小兒疳眼生聲方

細辛

黄蠟条

蒸熟取出去殼日服一箇〇以上三方余原本入眼目之部然專以 右三味為末糊丸先取雞卵一箇以錐刀穿孔納一丸以濕紙封固。 爲小兒之病移入於此

八神丸 治小兒五疳

藜蘆三雨 苦參

馬錢子格一黃柏

蝙蝠舞 大嘴鳥舞去樓爪

度七歲以下不拘歲數四五粒可用 右六味以糯米糊丸如栗粒大一歲以上者隨歲數而晝夜用各三

歸魚 震轉妙九度〇一作蛤蚧功用略相似歸魚 丹海勃丹 给小兒五班服用更加用 麥芽 白朮 甘草五分 治小兒五疳胎毒蟲咳雀目等諸症神驗 靑皮 澤寫三發 茯苓 山查子 白芍 使君子

框實統十 在十一味糊丸白湯送下。

白丸子 五疳殺蟲之良劑也 雜胆五發 黄逗 黄芩多二

甘草一般

右四味糊丸銀箔爲衣

拾疳蟲奇方

檳榔 枯礬等分

右二味細宗和制貼紙傳而肩骨妙

蜗牛數十<u>箇</u>去殼碎爲泥 味噌藥方 治小兒一切尸疳蟲者。

右一味調和味噌中同研煮服之

【蟲症】

鷓鴣菜傷 治小兒胎毒頭瘡蟲癖腹痛者

大黃三分或 蒲黃三分 甘草二分

右四味以水二合煮至一合空心溫服一二日而下蚘蟲及穢物佳鷓鴣菜三錢。 大黃三分 蒲黃三分 甘草二兒

方去補黃加苦掉皮

小兒癖

馬明傷 寮小兒疳蟲症

馬明退一發達 青黛五分 大黄二分 甘草三分

右四味以水二合牛煎取一合適寒溫服

又方

馬明退 紅花卷五 大黄二分 甘草三分

右四味水煎服

雞胆 大黄^{等分}

右二味細末糊丸白湯送下

【痘疹】

絲瓜傷 無辨痘不痘但嬰兒身熱呵欠煩悶

睡中驚悸噴嚏眼雖鼻涕出氣粗手足酸軟即先宜與股

桔梗

甘草经二

右五朱水煎温服 卷 英樂

解痘毒方。初熱之中服之則能解毒也。右五味水煎溫服

右二朱能覺調白易矣下絲瓜舞! 辰砂一分

右二味能攪調白場送下。 治痘瘡初發用之則考,不追咽喉

大戟一味

右爲来糊丸一晝夜二錢白湯送下

給痘瘡將發而或瘡上凹者方

青豆。然此紫河車路等

陽浴方、凡痘瘡至四五日六七日未起脹或譫語發狂或不食或疼痛 · 右二味細末糊丸白湯送下。毒踩者以桃仁湯送下

雜症變出當此時而令兒浴此湯則必快起脹

水上 洪 米 粮二升 好酒二十 赤小豆三粒 鼠糞三面 則再三%之而効兒五歲以下者宜用水四五升或七八升糠酒鹽 氣莫泄取微汗則必自起脹凡春夏行此法易起脹如秋冬難起脹 右五味者為熱場內盤中自兒頭面至手足遍俗之拭巾拭一身令

亦隨之增被

侁身散 治痘瘡陷伏不起或隱在皮膚中者

紅花 牛蒡子蜂四

黑豆三般 跳皮 桑枝尽五寸

右七味以水三升煮取一升五合洗遍身則大效

治痘瘡難起脹者方

右生者一味白湯送下或猪肉焙而餌之亦佳

雄黃臙脂散 冶痘瘡諸藥不驗見黑陷者

雜冠雄黃多

右先以三稜針刮破瘡以小竹管頻吸之而後取三味細末以水和 寒製臙脂傳瘡上而封令風不入則毒能解

治痘瘡有 蟲癖者方

烏梅丝二 黄連三銭

右三味。細末糊丸白揚送下。

治痘毒入眼者方

辰砂路

右二味和調敷一會

痘瘡使眼不開方

白檀上品

治痘毒痛甚血出不巳者方 右一味爲末塗眼胞殷數次

杏仁 雞子黃

右二味合研塗痛處

冶痘毒入眼失明方 鴨跖漬花紙

臍帶各格

右二味浸水以汁點眼中

解痘毒入眼方

蜣 最一 味 細 摩 點 目 中 或 暴 乾 用 之

松花散

痘瘡爛者用松花粉撲之

薫癢方

茵蔯

白芨

荆芥

右三味爲末以紙條點火薰之

荆芥霜掺之

急慢驚風」

積雪草 右四味水煎服 藍緞

牛黄二分

烚急慢驚風兼蟲症者方 馬明退三獎 蜀牟泉

紅花路一

右四味水煎服腹痛加青皮木香山椒 連錢草五分

治小兒驚風熱毒衝胸搐搦煩悶不已者方

連錢草生者一握碎而和水取汁屢以用之大驗或加藍草

【胎毒雜瘡】

龍葵散 冶初生惡毒

龍葵一般

田川田

小兒族

五五

右三味細末日三分白湯送下

紅花散 殺疳蟲消胎毒凡治小兒百病必驗 連翹経二

檳榔十分

七八味水煎服

金玉丸。凡小兒雜病ీ蟲及胎毒者此丸主之

紅花 題 與 人 草三 數 大 黄 三 级 大 黄 三 级 我 一 世 豆 五 分 级

輕粉五分

牽牛子五般

日三空心自荡送下屈醯病钱踩丸數止二十九 在八味為來觀丸如芥子大辰砂為衣自兒初生至三歲服六七九

解小児胎毒方

裁判 紅花格人 礬金

龍胆分五

枯礬三分

右五味水煎服或加大黄

冶電胸電報方未及形容高火養之 扇背衛發腫盆住是蹇之徵也 紫國每服自己分至五分五日或十日一服以肩生痛爲驗用之半年

小島鐵橋是在日本花台景文

給吐棄方

連發草三散社為草子的一種屬於一大黄連五分

右四味水煎服

拾小兒痰癖方

天南星 巴豆 朱砂路中

右三味細末糊丸服必便膿血丸藥以不化而下爲度

拾暴喘弁馬脾風方

大黃

雞冠石谷等

巴豆豆 右三味爲細末煉蜜爲丸十歲以上母服三分後服白虎陽佳

治初生小兒黶方

胎糞一味爲末博之

畫眉膏小兒至大七歲飲乳汁乳母欲斷之者主之 山栀子至蜜燒

雄黃

朱砂紅

右三味細末入麻油輕粉少許調勻候兒睡着慶林于一眉上覺令 不念乳若不効加黄丹一錢

治兒有舐鼻下之癖方

四君子陽方中加白芷餘依前法數服而益佳

拾鶴口瘡方

滑石

硼砂

辰砂路

右四味細末和水以鳥用塗之

小兒病

四八

馬明退 紅花谷等 甘草少許

右三味黑霜爲細末和乾臙脂塗患上不過三日而愈

天南星細末和糊傳足心甚妙。

解毒方

解魚毒方

款冬一味蓝根俱取生汁頓服之

解食蕈中毒欲死者方

茶篇末名

礬石

在二味水煎服之須臾腹中屬大便乃下明日復常

解河漏毒方

楊梅皮

右一味水煎頓服

下水銀方

右二味細末白揚送下從大小便以水銀下爲度 磁石谷等

解河豚毒方

五爪龍生汁一味頓服即效

拔竹木入肉方

芍藥等

右二、味爲細末和糊敷患上

治狂犬咬傷毒方

麝香 虎骨

辰砂路五

右三味爲細末先以韭葉自然汁洗咬處而傳藥末于其上且頻頻

洗之可也

萬花一般 大黄解酒毒方

治服輕粉劑口中應爛者方 右三味細末白湯送下

桔梗 甘草金等

菜豆 右三味水煎頓服

石榴皮一味水煎服又含之可也

治瘋犬傷方

竟角一味爲末·水煎服之又外和水傅患上久而又毒發者大黃一味. 煎湯入麝香少許水煎服至妙

解中漆毒者方

解毒方

四九

連根葉俱揩浴遍身也

溫館粉一味塗之鑷身

雑集方

神通傷 治飲食大過腹痛無吐下悶亂痛甚凡病當危急諸藥不效欲

死者可用之 良姜

丁 香 吳莱萸

大腹

右十二味水煎服分量存口傳

砂仁

沉香

木香

干姜

陳皮

莪朮

枇杷葉

連翹

苦參丸 治陽狂

苦參一味細末糊丸或煉蜜爲丸日服一錢兼服三黃寫心傷日二劑

治癲癇方

蝮蛇和 生漆不確

右先以蝮蛇和生体能乾調陰欖喬末糊丸白陽送下丸數多少宜

隨人強弱病輕重增減之

兼用方

虎骨一块

海人草

甘草路五

葛根

艾根

蜀椒 右七味水煎服〇凡烚療之間大抵百日禁房犯之則無效 苦楝皮

五〇

鐵朱散 鐵粉五錢 治大人小兒癲癇 靈粉二獎 製四級

桐木蟾鸡 硫黄丝四 巴豆豆

右七味蜜丸白湯送下日一錢服後必下利下利已則有又發者仍 前法用二三則拔病根始用三黃腐心陽數十貼以冷水灌頂而與

此藥則能應

右二味一服一錢白湯送下日二服至七日不發者試可令食噶蘭 而再發者又作劑如前法食竭不發者爲全蹇也 水蛭等分

右二味水煎頓服白雞冠花 甘草烯

治邪祟方

金銀花一味煎腸用之佳 亨按俗云有婦人小兒或以大病後血氣未調爲狐狸猫犬所襲者 又筑紫俗云河伯爲祟之類此方主之

墓 集 方

甘松香一味燒火薰之

打撲不選新久悉下之方

統魚二錢

右四味以水二合煮取一合服之

営歸

大黄一蜂 杏仁二紫雞鳴散 治打撲折傷

大黄一錢

右二味以水二合煮取一合臨臥服服後飲醇酒醉臥則至雞鳴而

死血盡下。

冶湯火傷爛方

黑砂糖十雨辰砂一般

又方 右二味調煉塗患處從手愈 海胆一味。塗之大効

沿 遺 留 方

猫屎養量上防己

甘草谷

右三味為末合調一服一錢日三

當歸-m 昭 治腋下狐臭方

明礬

輕粉每一

古茶二萬

右四味爲末白湯飲下。

寒水石建一名 始消渴之神和

甘草华姓 葛粉祭

治落深風方 香蘇散加木香,外楊梅皮末入鼻得嚏必瘥

續名家方選

上部病

【頭面】

清上場 治頭面諸病屬血熱者

四物場合三黃湯加山梔子。桔梗香附連翹薄荷甘草

右十三味水煎服

治頭層方

黑豆一味以醋煮數洗之甚妙

拾婦人血風諸頭瘍方

薄荷 生地黃

右二味水煎此方平劑然能奏殊効

芎藭-兩 土茯苓五酯治平素有頭痛癖者方

右水煎服或為末白湯點服

【耳】

给大人小兒聤聹方 山鳥尾黒羅麝香ツ

尚藥局生徒平安村上等順著

右二味浸麻油點耳中未止者加朱少許

治有小兒停耳癖者方

藿香正氣散本方連進數貼妙

止耳痛方

生石菖根汁灌入耳中妙。

又方 白芷浸麻油入耳中妙妙

又方 白百合浸麻油入耳中

治耳鳴不聞者方

黄柏

麥門

當歸

桂枝好

右五味水煎服

療中年後耳鳴方

大味丸料加菊花蔓荆子蟬蜺水煎服

【鼻】

辛夷陽 治鼻塞 清 海 強 出 不 聞 否 臭 及 腦 漏 濁 涕 不 止

白芷

菊花

陳皮略一

石膏

川芎

辛夷

生苄

右十二味水煎服

療酒酸鼻奇方

枇杷葉

山梔仁

黄芩七二

連翹四十

上部病

薄荷

赤苓

前胡

炙甘二百

五五五

頭自覺冷佳兆也 右四味水糊丸梧子大每服五分白湯送下或作湯兼用之盆妙準

又方给久年者妙劑

當歸層製 大黃五錢各 沉香四钱者 川芎三黄 香附子嫩

右五味細末食後煎茶服

療鼻痔方

芒硝細末點入鼻內數次

蜜陀僧 白芷多

右二味爲末生蠟調和傳鼻中

「眼目」

黄連

猄明飲 療風熱上衝眼目赤腫者

當歸 柴胡 羌活 黄芩

防風

芍藥

生苄级一 山梔子 川芎至五 甘草二分 升麻

右十三味剉水煎服有赤脈者加菊花木賊白睛赤腫痛甚加桑白 皮多淚不止加荆芥薄荷菊花

養明飲 黄柏 療者眼虛眼中氣不振飲食不進者 白芍藥路一人參

黄蓍烙七

蔓荆子

甘草二分

洗眼方, 右八味剉水煎服 **洗諸眼翳障要方**

寒水石 爐甘石 石膏

辰砂點一 龍腦 麝香华縣

右八味極末鍋包和水洗諸眼甚妙

龍腦散 眼科傳方言云凡諸眼痛治之良方也

石膏四葉 **真珠**一分 寒水石六縣 滑石四縣

焰硝二縣 麝香一縣 白礬二 龍腦一章

障或血濺眼則滑石蛇骨。等一白龍三紫牡蠣一分雀子一紫貝石赭石石膏龍腦。等一麝香滑石。等二極研和本方點入若外障或翳根。等)具齒。白丁香。蜂二樟腦。等極研和本方點入若內障則代右入味極研末點入眼中若眼中生瘡。白輪多血則加蓬砂雀貝葛 鹿角 二葉 天石 六歳 麝香 少極研和本方點入

石膏散 治眼中多淚妙方

滑石三號 开一 光明朱一縣 石膏三縣

右四味極末點入

焰硝散 治爛弦倒睫要藥也

上部病

石膏 樟腦分等

五七

右三味極研末和水塗眼四周若倒睫則鑘子拔睫毛塗之

蓬砂散 治血輪見血脈眼中生菌之類

始確少 蓬砂 黄 麝香少

决明子 朱砂路 龍腦少

右七味極研末點入

黃連湯 洗眼中疼痛甚者尤妙 黄連 黄芩 甘草谷八

生石菖蒲根一数

燈心三分 文錢十號

右大味水一合煮取七勺頻洗眼中○以上六方名響眼科家所傳

無敢以授人雖似則泄天實今錄示之同志

始爛弦方

銅粉三分 黄柏生六分 黄连生末

右爲細末蜜煉水和調以鴉羽塗其爛處不欲入眼中

小柏散 给一切上氣熱症眼疾

乳香

黄柏

小蘖

右六味等分一錢許裹緋帛漬熱陽洗眼目且蒸熨亦佳 紅花

溫侁眼目方 洗冷淚

肉桂谷等 白礬減半

右三味盛絳囊漬熱湯林眼中日數次

胎疣目方 百草霜 鹽分等

右二味合研入臍中紙蓋其上

治 衝 破 眼 方

水仙花根一味研如泥點眼中。

療雀目奇方

五苓散方內加芣苡蒼朮水煎服

除眼翳方

蓬砂一味 極研末以燈心點霽中.

制疳丸 靑皮 治小兒烏睛見聲或痘後生野者及疳眼通治良劑 黄連

縮砂

和胡黄連 莪朮

臭梧桐蟲潘後曝乾

乾漆

右細末四錢許煉熊胆五分丸梧子大日服五十九七日而效外龍

腦散點之

治痘後毒 入眼中痛者方 熊胆谷等

右二表乳汁和調點眼中

【口舌】

治口瘡及牙齒根臭爛或黑色或疼痛甚者

上部病

大 0

黄柏一雨 青黛二鏡 黃連 白芷蜂

細茶餐 麝香三分

梔各一錢摻患上粵之則延出而愈 右七味研末傅患處若舌上生瘡爛痛者加酒炒黃芩干姜細辛山

黛紅散 拾舌上赤爛生小瘡 黄連

右三味爲末食前塗舌上 紅花分

療口舌破裂腫痛方 莽草乾陰一味水煎頻含之吐

黄柏豆

右七味水一合牛煮取一白温含之

療舌疽方

梅干肉酱四巴豆一 枯礬二分

治上焦鬱熱口中及牙齒痛腫方. 右四味燒存性合和傳之

右三味水煎頻含之後吐 黄連 石膏各等

【牙齒】

清熱白虎飲 治風熱攻往牙根腫痛

石膏一錢 升麻 茯苓 連翹谷人 知母終一 朴确六分 甘草芸 山梔

右十味水煎食遠服頻頻含嚥則愈

拾血熱衝上 齲 歯 痛 方

四物場方內倍加山梔子水煎先含後嚥之

治胃中 擊熱 牙齒腫 痛方

平買散本方加升麻煎服

治 齲 齒 方

南星一味為末和麻油左痛則投左耳中右痛則投右耳中則愈

治牙齒疼痛 不可忍者方

隨牙齒疼痛左右橫臥納入白焰硝細末少許于痛方耳中滴醋少許 則耳中蟬鳴齒痛徐止則伏下其耳則藥汁旒出而驗

【咽喉】

通喉散 療咽喉腫痛或喉痺食難通或骨硬後疼痛甚者

在三珠各黑霜為細末吹咽中。黎寶蓮華葉 鹽梅肉三類 昆布六寸許

治咽喉腫塞勾欽難通者方。

上作病

橙皮精 黄連幕 生昆布 甘草少

右四味細末白傷送下或加辰砂

療喉痺方

鳳仙花實爲末吞下則愈

又方 治勻飲不入語言不出始將死者

烏頭 皂角刺粉

治骨硬方 芭蕉葉嫩生卷出者陰乾水煎服

右三味為末以蘆管吹咽中、吐膿血則愈而後隨症可識治也

橘核三五枚細嚙吞下妙妙。

抬喉風方

白姜麵的茶 訶子格二 薄荷

右四味細末以管吹入喉中

【喘急咳嗽】

定喘飲

橘皮

华夏 茯苓

療諸喘急屢起發者

莪朮 寿 甘草三分 生姜一片

右七味水煎溫服

桑白皮格

喘急奇方

無槵子黑 阿仙藥無末

右二味各別調一服黑霜一服細末白揚互用

救喘急息迫將死者方 茶實一味濃煮汁少許熵鼻中妙妙。

沿喘急塞迫欲死者方

黃蓍建中湯加薤白熟附子照常水煎服

茶實丸 治前症愈劇者

百合根 攀石祭

茶實生熟 右三味研与爲丸每服一錢空心白湯下

雞卵濃場 治咳逆上衝不得臥喘急塞迫者

雞卵一質

右沸揚攪調和白砂糖頓服〇此方清人常服爲補虚養生之妙具

桔梗半夏锡 療久喘咳嗽

瓜蔞根含五 桔梗 陳皮 當歸

茯苓

半夏分八

莪朮

甘草三分

枳殼

止咳奇方 治煩咳甚者 右九味水煎服

阿芙蓉 1 髮 阿仙

乾姜

桂枝

罂粟般格二 細辛五分

上鄉機

大三

右六味糊丸日用三分或五分稍安者止後服

虚咳丸 治久咳數歲不止者

質汗 伊計摩 松脂分三

烏梅

甘草丝

右五味糊丸用

右二味水煎服

百合場 治寒熱虚咳殆類勞者.

桔梗

沙多谷等

牡丹皮

甘草二分

生地黄

治喘滿欲死方 右九味水煎服

睦風

朱砂

右三味爲未白場下。

【隔噎反胃】

大醫試效云凡反胃證在男子則十六味旒氣飲合六君子揚煎服在 女子則同方合正氣天香傷煎服此方至此

治反胃方

馬蘭十鼓 茯苓二穀

右二味以水二合煮取一合服

治隔噎方

茶毗所灰少許白陽送下

又方 野蒜和粥煮頻食之妙。

治膈奇方 反鼻一味先作鹽玻稀湯煮之三沸俱米子攪下傷內服驗

上部雜注養方稱少而不是舉門類

又方 喔甚藥食難用者用之婦人女子多有此症皆主之 嘔家奇方 小半夏加茯苓湯、内加白梅花一味用之妙妙。

馬蘭一味陰乾炒甘草少許水煎溫服

· 林核二次療諸吃逆方

蜀椒十粒 丁香五粒

右三味以麻沸湯漬之飲服

養血清心丸 凡人口吃語言蹇逝者心血虚而火亢甚也輕者語雖重

當歸一發 麥久六錢 者口眼喎斜醫誤爲中風者此方主之

青皮多人 黄連十数 薄荷五餐

右十二味爲細末糊丸菉豆大每服五十丸臨服空心熱酒送下O 牛黄二族 甘草二 甘草三黄

此方往昔鹿苑上皇珍貴之方也

治瘭疽及一分指腫方

上部病

杉葉舞三鉄 鼹鼠二袋 丁子八分

右三味爲細末和梅肉與飯煉和餔紙上傳之〇按此方手腕以上

足腨以下一切腫痛之病奏殊效

療瘭疽方

毛茛花二分 甘草二分

右二味水煎服

療瘭疽疼痛不可忍者方

亂髮灰一味和麻油傳患上即愈

又方 小麥粉一味和麻油傳瘡上

拾指痛方

水仙花根研調以釜底墨和之傳患上

療痜瘡方

娛勉 紫草品等

右二味為末和麻油傳之

沿臂痛妙方

木龍子 插 桂枝五鎮

冶狐臭方

右糊丸用

巴田 1 胆礬大豆

麝香ル

田螺一蘭 右先以田螺一箇投于水中三日吐泥開蓋入三味未以絲縛田螺

大大

前法 之蓋而納于器中明日化爲水臨服以藥末傳腋下盡爲度後覺心 腹痛為住臭氣從大便下宜別風莫使臭氣感他人若不愈更傳如

中部病

【心腹痛】

調中散 冶諸般腹痛奇方

牡蠣六雨 甘草 丁子

右五味細末白湯送下

療虛腹醫藥無效或血氣留滯久腹痛難愈者方 乳香

延胡索多

右三味水煎服

療心痛方

鬼燈籠實養 右一味水煎服

化蟲丸 治大人小兒諸蟲瘡

鷓鴣菜 二十 甘草 廣椰子 蜀椒谷十 牡蠣一枝 白攀谷五

右七味和丸

给心痛微背縮脊聲不出者方

六七

續名家方選

五靈脂一致 乾姜五分

右二味以水一合半煮取一合肉童便三勺服

二靈場 治嘔吐腹痛胸中氣結痰飲窒塞惡聞藥食氣專屬蟲積諾證

香附子谷等

紅花 有起死回生之妙不可盡述 食惡心嘔吐者醫誤爲虚症以補劑則惡候蜂起臨此際用此方則 癇症氣逆衝上眩暈惡心者加沈香沸揚用凡蟲積症脈微弱全不 兒風熱解後餘熱不除者有屬蟲者加柴胡葛根陳皮茯苓水煎服 有蟲積熱不解者加柴胡葛根山梔子芍藥茯苓生姜煎服婦人小 之因蟲嘔吐不止者加橘皮茯苓生姜水煎服咳甚不止屬蟲者合 圖基按此方先師以來常常活用之良方也今取其隨症加減法錄 右三味以麻沸湯漬之須臾而用之卽效 二陳陽加青皮蘇子杏仁水煎服熱病吐不止譫語全不納食者間

安蟲丸、大人小兒蟲積腹痛必用之劑 黄柏五丽 黄連三兩 右七味,丸梧子大白湯送下 苦參三兩 檳榔二兩 黄芩一用 **莪朮一開** 楊梅皮一兩

治諸蟲屬冷者

香附一般 右五味爲末白陽送下或煎服亦可 良姜七分 丁香五度 陳皮隆三

香附三数 黃柏三級 胡青木香丸 沿諸蟲屬熟者 右四味為丸用。 黄柏黑红 胡黄連一线 青木香五分

雞胆丸 治小兒腹中有蟲喜食土器壁土或馬糞等者

雞胆和著住一黃連 大黃 椰醬品等

右四味爲末糊丸梧子大每服五分白揚送下

貼積塊方

穿山甲 檳榔

靑皮

枳殼

木香

雄黄

莪朮

牛膝等

右九味爲末以海蘿煉貼血塊以紙蓋其上又加南星角石盆妙

置豆豆蟹 糖霜一蟹 雞子黃中場 沿腹中攀急大便噪結

空心頓服 右三味以水一合先煮蠶豆三沸去滓,內糖霜及雞子黃攪勻,臨臥 雞子黄一板

下部病

【疝痕腰腹痛】

下邮新

六九

七0

治寸白蟲方 治寸白方 治久年寸白其證眩暈頭痛或胸痛時傷食或面腫筋骨疼 杜松散 療疝瘕腰腹疼痛諸藥無效者方 臭橙飲 檀椰子丽-痛寒熱往來似勞者 燈籠草根五分 杜松子三葵 桂枝 桂枝路一 臭橙皮 右入味分如常法照常煎服有熱倍丁子沉香頭痛加川芎風加陳 右五味剉水煎服 皮小便雖加木通胸補倍檳榔並甚加炒茴香 右四味水煎服 右七味水煎服 治一切疝氣拘攣者 **恰加瘦偏墜腰脇孿急** 木通二族 丁子 整米泔水便晒 甘草 芍藥路二 大黄 薏苡仁五分 梅松實元 圖去皮 茴香 枳殼 大東名五 沉香烙一 茯苓分子 茴香丝 吳茱萸 州子 甘草三分 框實去達皮生黑

甘草少許

右細末白湯送下四錢

黑丑

【牀疾】

石林散 始砂石林奇方.

浮石 阿廖维 木通

甘草品五

右四味剉水煎服

海金砂醬美滑石

海海水砂

海海金砂醬美滑石

海方 甘草一分

右三味爲細末麥門冬傷送下

血淋散 治血淋

無機子二級 白砂糖一致

右二味劉水煎服或海金砂一味砂糖揚送下亦佳

胡桃肉三黄大麥六分 茯苓治療疾大奇方 右五味水煎服頻驗

甘草

燈心经三

蒴蓋三級 甘草三分療諸淋方

右二味水煎服

右二味水煎服 七黄七分

不解棄

冶附疾諧藥不能冶者方 茶毗所灰一味白湯下

療淋疾痛甚者方

砂糖分

右二味爲末的湯送下。日二錢

治婦人林歷痛甚者方 蕪青葉海 款冬根者生中

右三味水煎日二服

又方 此方百發百中之妙劑 早稻葉鄉數 黑梗米中 甘草少

右三味剉水煎服

銀杏子屬 冰砂糖三獎甘草少銀杏湯 治婦人淋歷疼痛不可忍妙方.

右三味水煎服即效

治婦人林歷陰中痛甚遂至四肢厥冷者

【下疳瘡】 生牛膝一味水煎而後傷成入麝香少許頓服妙妙

即驗丹 治疳瘡及毒腫發下部陰股邊者立驗 輕粉變二

角石二 大黄

黃連

右七味細末糊丸椒目大辰砂爲衣每服一分 光明朱五分上茯苓三錢

傅下疳腐爛方

角石五分 百藥煎二分 輕粉一分

右三味爲末以黃蜀葵汁和之溫湯洗患處傅之

治玉莖將落者方

信石末二分水一句

右二味攪調以鹅翎洗之後敷膏藥

洗下疳瘡方 毒氣不劇者但此先方妙

防風盛二 薄荷

黄柏县

甘草五分

金銀花

右五味水煎洗患處

【 捧 】

逐瘀湯 治痔漏疼痛內有瘀血作疼痛通利大小腸取下穢物立效兼

治赤痢血痢

白芷 生地 茯神

茯苓

五雲脂緣一桃仁

大黄蜂

川芎

枳殼

赤芍

木通

阿膠

生姜三片 甘草

蜜三七

沿痔酒醪方 右十五味水煎空心服以利爲度

下部病

七三

治痔疾大腫痛奇方 右一劑陳酒一升冰糖十四錢調和一夜漬之去焯服之 生地 肉桂 香附 薿絲子 **芍藥%以** 白朮 甘草二分

桃仁 右三味細末和麻油塗之 乳香袋 麒麟蝎三分

治瘀血痔痛一方

黒丑

救痔痛疼甚難堪者方右三味爲細末酒送下數日服之勿息 當歸

青木葉百枚 薄荷十段

右二味濃煎洗之

治痔突出難愈者方 丁班魚三箇生水吞之

長砂ル

猪膏二級

右二味塗患處

療痔疾方

躛葉

模葉 甘草五分

連發發五

右三味水煎服

療痔漏脫肛諸痔腫痛及淋痛,海帶一味煎汁洗腰下妙妙。

補中益氣場本方內加智母黃柏紅花水煎服

拾內寿下血方

梅異霜

右方寸匕鹽場下

治寿痛方 **茄莖剉煎洗之**

沿舊年痔瘡傳藥方

赤螺三邊牌 白粉十段 右六味和麻油傅之

輕粉四線

樟腦三錢

龍腦一段

麝香三分

枯痔散

攀石二兩 蟾酥二餐

輕粉四鉄

右五味燒二炷香極末貼痔上則即落

砒石 富

靈天蓋四段

拾五寿方

熊胆一味水解塗之忽愈他方皆不及此

治脹痔下血如往水者法

下部病

故再出之 每遇更衣取河水灌之妙妙〇此法原出蘇沈良方今用之神驗無比

【脫肛】

良姜圓 治脫肛奇方

良姜 乾姜 桂枝袋 赤石脂類 粳米五分

甘草二分

右六味糊丸梧子大或作湯用佳小兒盆妙

冶脫肛奇方

芍藥 香附子 荆芥 白朮分七

茯苓蜂

人參

黄蓍 沈香

大黄络

白芷 甘草経五

古草機細末和麻油塗之

拾脫肛方

右十二味水煎服因毒者益妙

拾脫肛妙方

妮鰌大者三五枚同冰砂糖一雨納一壺中华日許則妮鰌自死其色 必赤而去死鲍則冰糖化爲水乃取其水多塗肛門納入之無不納者

治肛門痒不可忍者方

治大人小兒脫肛妙方 半夏末和姜汁先洗肛門後塗此藥則大痒一陣而愈

右糊丸梧子大日六十粒 梔子炒 榴皮多五

治下部痒痛如蟲嚙方

水銀分等

右二味如事青調綿裹夜臥入穀道中試效

【遺解】

香龍散 療遺解要方

雞舌香二分

右二味細末臨臥白湯送下後溫酒任性凡自七歲至十歲每服五 酒送下惡酒者白湯亦佳不過二十日而瘥 分自十歲至十五歲隨年壯每增至一錢十五歲以上每服一錢溫

尿狀奇方

烏骨雞屎水飛細末一錢溫酒臨臥用五七日驗

破故紙散 治遺尿奇方

破故紙一味酒蒸七次為散合病者含一蜆殼許胡麻鹽和勻服

冶遺尿奇方

右六味細末白揚服之又外脾俞腎俞腰眼欠灸數十壯效 牡蠣 茯苓 肉桂 桑螵蛸 龍骨谷

下部病

治小兒尿牀方

赤小豆葉自然汁燃之用速效

【下部雜疾】

柿實黑 和糊塗之

敗筆頭灰二匕白婸送下,牛時許而卽通.给小便頓閉者方

療頓癃閉者奇方 枇杷葉十世 巴豆八分 於久里加牟季里五

右三味細末和田螺貼臍中。

土茯苓湯 療職瘡 阿仙藥一味極細末擦之妙。

土茯苓 櫻皮

右五味水煎服

忍冬

廿草

解木皮给

外因病

【中風】

治中風初發者奇方 冶偏枯卒中初發者

棕櫚生葉五錢 桂枝三穀 紅花三錢

右四、果霜爲細末溫酒送下十四日。

梭葉湯 治前症初發者凡手足麻痺者服之妙

紅花 荆芥 白姜蠶錢二機欄葉五錢

右四味以水三合煮取一合牛溫服

偏枯奇方

白刀豆 白刀豆莢 久曝雨露古葉輝.

右三味各別黑霜調之入入物場煎汁中三匕許而患處覺痛佳兆

也而再加香附末一七多驗

療中風箸痺方

属仙花性實並具有

茯苓 半夏路一

右三味以水三合煮取二合日服二劑此方每歲期月日服一劑則

預防中風妙劑也

【歷節癟風】

白朮傷 療漏風妙劑

知母

紫蘇

獨活

芍藥

甘草治 生姜一片金銀花谷八 葛根三分

右十一味水煎服

治痛風走住骨節疼痛

外医病

除痛解毒飲

七九

防風祭七 忍冬 土骨皮

甘草二分

右七味水煎服〇圖基按治痛兼徽毒者觀宜堂日用之良劑也

療風毒疼痛甚者方

右三味。細末溫酒調下二三次而立愈、木槽 青麻学芸 干鮭鱼

療風毒劇痛方 笋籜十發

右剉以水一升酒三合煮取七合數服之妙

拾四肢疼痛難屈伸者方

夏枯草粗末作大劑以水三升煮取一升洗患處或蒸之生

治勞霆難截者方

丹水翁驅邪陽方內加上品硫黃少許數日連進之則自然而截也

吐瘧妙方

千歲萬一味極細末二錢許常山細末一錢調和發日早晨冷水頓服 須臾而當吐乃截

截瘧奇方

檳榔

和常山路一莪术一典

甘草五分

右五味細剉水煎從發日前夜至曉連進

截瘧一方

須坐羅之二 験

甘草一錢

右二味水煎發日早朝頓服無不截者

截瘧丸 平穩之截方

右一味研爛丸如梧子大白陽發朝送下五十九〇圖基按此方原常山鄉華三發 烏梅肉西枝 出醫宗必讀世俗患瘧者畏截方發吐不敢服唯此方常山妙透則

不發吐而截也

治 久 瘧 諸 藥 不 效 方

猎胆一味**白**揚解之頻服神效

【匑】

療痢疾 一方

忍冬盛二 芍藥 茯苓 黄連五分 甘草少

右五味水煎服〇圖基按凡痢因于濕熱故此方不拘寒熱皆用之

給其本也痢藥古所未用而頻用試效

療禁口痢方

妙蓮肉一味為末每服一錢白湯送下

【继篇】

外因病

益中散 治感寒冷泄瀉腹痛者

芍藥

干姜

甘草金

良姜大餐 茴香四餐 甘草二餐良姜散 冶因酒毒常常泄瀉者,右大味水煎服

右三味爲未白湯飲下

(李) (秦) (秦) (秦) (秦) (秦) 療癢疹常發不止者

川 前 避避

薄荷

右十三味水煎服

白天麻

茯苓 梗

生姜多

甘草

内因病

【虚勞】

蛞蝓霜一味日服一錢分三服給勞瘵初發者方

下察蟲方 蜀椒

烏梅

青黛

薏苡酱

疳勞丸 治疳勞初發咳嗽盜行黃瘦 茶毗處煤七級 少滅之 右三味糊丸空心黄蓍湯送下十五歲以上每服七分日二夜一小 右四味爲未丸梧子大日用百丸 甘草三錢 麝香二分

類肝丸 治蟲寢勞

類肝陰平二 地栗三錢 惟實二数

右四味糊丸梧子大每服三十丸日三白易送下 鼈甲八分

拾遺精久不止盜汗口心煩熱等症方

石膏

枳殼

厚朴

白朮 牡蠣

山梔子

黄連

甘草祭

竹茹 右九味水煎服

【血鑑】

三奇丸 给咯血吐血下血奇郊

右六味,糊丸梧子大三十九日三四度,白陽送下。 黄連路三 犀角 滑石

花雄石散 冶衄血吐血及熘血打撲出血血氣逆上甚者。 甘草分入 龍鵬三分

花蕋石醬三 辰砂 右五味爲末白陽送下 黃連

內因病

青黛

۸ ج

二灰散 止吐衄崩漏諸血之聖劑

辅黃醋 機関機存 聞 髮 燒 年 持

右三味細末每服一錢童便和下急則從醋場亦佳

止衄妙方

胡粉炒黑細末醋服一錢即止

拾金瘡血不止者方

紫蘇葉五六月間取之陰乾

茅穗一味敷患處

又方 给出血不止者

拾蕃血症方

朝鮮石榴花陰乾細末置舌上律液送下

【黄胖】

鍼砂湯 擦黃胖病心下痞或滿行步則短氣動悸甚者. 茯苓 白朮 甘草路一

桂枝 鐵砂七分或 人參

牡蠣多人

右七味以水二合煮取一合溫服

牌勞丸 療脾勞黃胖

右爲未蒸餅丸梧子大白陽送下。 乾漆燒存姓 香附子三錢 平胃散末五錢

黄胜丸 鐵砂百錢 療黃胖病 葛根 黄連品二

右四味爲末糊丸梧子大每服二錢日三白湯送下 百草霜五錢

蜀椒+t 綠礬 燒紅 綠礬丸 治前症

棗肉

胡桃去枝

圖基按此症惡鐵氣者宜用 右四味爲末糊丸赤豆大每服二十九日三以平胃散煎汁送下〇

水飲病

【水腫】

两陸四級 出門 出玩 馬功丸 治一切水腫及脚氣腫滿者

芒, 吳茱萸 甘遂二级

右五味糊丸梧子大飲下數十九

桃花水方 治大小便不利腫脹者

右三味以羅牟比喜蒸取液汁臨服入砂糖水一匕服

療水腫臌脹方

右四味以水二升煮取七合一日服盡一劑病重者日服二劑。载 陳皮 當歸簽 忍冬十錢

水飲薪

人五

八大

療產後水氣方

瓜蔞根一味爲末貼臍上消腫妙。

治產後水腫方

味噌霜爲末每服一片日三白揚送下

瘡腫病

【癰疔】

清熱拔毒飲 療癰疔熱毒劇膿血不出者

黄連 藿香

黄芩

樱皮二量

連翹路一 右八味水煎服 沉香二分

療癰疔及風毒腫方

連翹

忍冬年 木頭

黄射 右七味水煎服 白朮

水蛭黑和 鹽梅山治疗瘡疼痛甚者方

右爲末傳疔上止痛甚妙 **随一梅 肉果霜各**

【疥癬】

木通

升麻

從革解毒傷 金銀花 莪朮黃連〇凡疥瘡不用他方不加他藥奏效之奇劑也 在六味水煎溫服若有腫氣者倍莪朮腫在上者倍川芎在下者倍 土茯苓蜂二川芎一種 治疥瘡始終之要方。 莪朮 黄連谷七 甘草二分

調樂解毒湯 療痒瘡血熱甚痒痛不止者 強加藥

玄參 防風 當歸 香附 川芎 紅花 金銀花路中大黃二兩 攤退

右十一味水煎服

何首鳥散 療通身瘡疥經年不止者 威靈仙

右四味為細末每服二錢食前溫酒調服日三服忌發風物 蔓烘子 何首鳥 苦參等分

掌中摩散 治疥癖

右六味爲末雷丸油煉膏丸如胡桃大臨用蜀椒一錢以水四合煎 三合先先手掌拭之而後摩掌中數十回藥氣盡爲度 大黄 樟腦 山椒丝 水銀 川芎五分數

止疥癬瘙痒甚者方

疥癬內攻方 療疥癬諸毒內攻腫滿者 連錢草自然汁搽患上忽痊

赤小豆蓝 商陸 反鼻

猪腫病

桂枝

人七

大黄酱

右八味以水四合先煮赤豆取二合入諸藥煮取一合日三服

療一切癖瘡方

右四味爲末酒和傳患處三日後鹽場洗去之 大黄 大楓子 黑胡麻魚

【黴瘡】

荆芥解毒湯 療楊梅瘡已發未發兼筋骨疼痛者

土茯苓五錢 當歸 黄芩、 川芎、

地黃色三

荆芥二酸 右八味水煎服 芍藥

甘草路五

麵粉化毒散 療遠年近日楊梅瘡結毒難愈者代五寶散用

白麵八錢

大黃四條

反鼻

妙妙

或加輕粉五分

血蝎谷一錢 乳香 右九味爲細末煉蜜丸梧子大日三錢或四錢隨症上茯苓煎汁送

反鼻化毒散 療楊梅瘡結毒諸症

連翹終二

反鼻

芎藭経三

大黄

土茯苓蜂四

右大味為末每服一錢溫酒送下

六物解毒場 療結毒上攻咽喉腐爛或一身骨痛或淋疾疼痛

木瓜路一 金銀花二發芎藭一般

土茯苓五錢

右六味以水三合煮取一合半溫服

【雑澹】 吸煙散 治黴瘡結毒、淋疾痔疾脫肛疥瘡、風毒癰疔等之妙劑

辰砂 沉香 朱砂 硫黃 甘松 赤石脂 木香酱一 生地黄 當歸終二 石膏

明礬 右十四味爲末盛紙袋爲七貼漬麻油點火吸油煙日盡一袋勿含 樟腦 杉梢葉灰酱三 茶一般

口中恐損齒舌也

連翹解毒飲 療大人小兒頭瘡及臁瘡. 乳香 木通 防風 沉香 升麻丝 羌活 大黄 連翹二分鏡

丁香

黄芩谷七

右十四味水煎服 木香 桑寄生一致麝香五里

療頭瘡方

松子黑精

右一味爲未和麻油傳之

瘡 腫 摘

撩眠瘡方

鹿角霜 黄柏

南星 右四味爲末水調和傅患處

療湯火傷方 春椒^{選月采} 若一味和麻油傅之 療湯疾傷方

右一味和麻油搽患上

療灸瘡方人中白一味水解傳之

海螵蛸 明礬分

右二味為末傳患上

廢痼疾

【癜風】

療赤白癜風方

桂枝

石硫黄金

右三味爲細末以布包之摩殿上摩了白陽先去

九〇

又方

右三味爲細末葱汁調傳之 胆礬 輕粉分等

失心丸 【癲癇】 給失心癲癇狂症甚妙

大黃路五 黄連

乾漆丝

右四味細末糊丸梧子大

奇效丸 治癲癇

楊梅皮三曼 胡黃連 熊胆二维

木香十號

胡椒蜂五 **嘗爲世命侍醫製之遍與人以爲教世之具。** 右八味熊胆水和入藥末糊丸辰砂爲衣〇此方一大侯家之珍方

秘傳反魂丹 主治一切癲癇小兒內證諸疾或瘧疾久不愈而爲瘧母

諸藥不効者及驚風癖疾,疳蟲盡治.

胡黄連名三錢七 丁香五厘 甘草或年 三稜

乳香

雄黄

牽牛 枳敷

知母

麝香一錢二

白丁香百五十粒里

熊胆養水去腥氣 右十九味先十七味爲末後內麝香熊胆和勻蕎麥麵各等分水煉

廢 瀊 疾

人參

黄連 靑皮

陳皮

大黄

黄芩至五分

以上三九十歲以上七九十五歲以上十五九 與之後不出五日而一發者數十日不再發者愈之兆也小兒五歲發者易治或雖經年不愈者一日一發二日一發者服之可至百日 丸和丸如梧子大辰砂爲衣〇凡癲癇新發者服此丸三十九不再

治癲癇奇劑二方

蓬白湯 生艾根米雅廣 虎肉類篇十

古 參米 淮 演 題 表

山椒軒 鷓鴣菜一致 甘草一线牛炒

右一劑以水六盏煮取三盏露星下一宿溫頓服

次下蟲丸藥方

辰砂三分 巴豆炒三分 胡椒五粒 丁香出

右四味細末以芳野紙包之前傷再煎送之下再煎之法以水四盏 煮取二盏露一宿溫服服藥中禁忌房事糯米醋川鱗一切肥腻一

百日用右件藥必下赤色蟲爲效

白茯苓八歲 莪朮六歲 沉醒心茯苓丸 治狂亂神方

沉香上級 朱砂四號

白虎陽 右四味水丸梧子大朱砂拌為衣日用百丸白陽送下宜兼服黃連

癩病

抬磨病方

川芎 山梔子 黄連緩外

白檀 此南蠻流外科家傳方。有試効者也蓋用諸家相傳治顧之丸方者。右七味一劑。入土茯苓一倍照常水煎但量水可用大器〇圖基按 茯苓

地黄名等

治癩瘡潰爛方 宜兼服此方。

蝸牛

右二味爲膏和麻油塗之

治療瘡愈後血色穢惡方

狼屎醫干 人屎醫乾

右爲末糊丸萬根爲衣每朝小便送下男子用婦尿婦人用男屎

婦人病

【經閉血寢】

浮石丸 治經閉及血塊症

莪朮 三稜

桃仁

大黄

右五味爲末糊丸

治血塊方

芥子粉醋和敷患上間有瞑眩者

浮石谷等

九三

拾血塊奪劑

芎藭-鈴 巴豆豆

右二味爲末白陽送下

始血塊奇方

南天燭實 海藻谷等

右二味水煎服或四物湯加之亦佳

拾經閉及血塊緩方

雀頭重便 盆母草黑霜各

右二味爲細末四物傷煎汁送下日盡一劑

拾經閉方

牛蒡四蓝鸡薄片

芥子粉八分

右二味浸酒三四日去降溫服至妙

给月經將來時時腹痛方

乾茶餐四

右二味爲末生地黄汁丸梧子大白揚送下

【崩漏帶下】

拾赤白帶下神方 能登產青魚頭

右爲末白飲下

九四

四物湯加劉寄奴

又方 先服四物湯本方七日而後與後方

白荆葉字黑精

右一味爲細末。白湯送下。

坐藥方 治久不產陰中隱隱如蟲嚙冷冷如風吹或轉胞不通或妊子

不成慣墮者。

桂枝

芎藭 丁子

右四味各研末。盛以薄絹袋大如指如棗以納陰中。坐臥任意勿急

行走日換三四度欲溫下體之氣者主之

療崩漏奇方

蛇苺一味連莖葉水煎服或隨症方中倍加用

療崩漏及白帶神方

奉書紙 椶櫚

阿膠為籍分

右四味爲細末白湯送下。

療姙娠中雀目症方

四物湯中加梔子。厚朴枳實水煎服

(妊娠產後諸病)

產前產後八物湯隨症加味用

胎動漏痛者本方加黄芩砂仁

臨產腹續破漿而赤色穢物未下者加黑姜肉桂產前未娩而乳汁淚

出者加黄芩縮砂人参

治半產後及順產後腹痛不止方 產後氣血俱處痰火泛上眩暈者本方合二陳陽去芍藥水煎服

柚皮醫乾

右一味水煎服

始胞茲不下奇方 上好清酒二合

世确六章

右三味煮減二合頓服

鐵漿一味少許盛杯飲之,治胞衣不下者方

療横產逆產難分娩者方

柏核一味爲末五分或一錢白湯送下則腹中雷鳴切痛爲催生之徵

下產後穢物未盡者方

玄胡索 沉香

芍藥

大黄 桂枝蜂

撩兒枕痛方 右七味煎服

當歸

酸漿草二錢 莪术五分

右二味水煎服

沿產後血暈方

猿胆霜爲末母服一比日三白場下·

清魂散 主治血量極效

人養宣展各 荆芥四雨

炙甘草八级 川芎二兩

右五味細末的陽送下。

清黃散 治產後惡露不盡血上搶心煩悶昏迷或狂言 乾荷葉後 延胡索 牡丹皮 生地黄 甘草设工

右六味水煎服

當歸散 冶產後敗血兒枕塊硬痰喘臍腹堅脹

鬼箭丛本 紅花祭

右三味每服三錢酒一大盞煎七分食前溫服

沿產後氣脫方

加味芎歸湯、治惡露未盡大腹痛者試效。 寒中大嘴烏一味黑霜用之能挽回元氣

當歸 玄胡索 川芎路 牡丹皮 靑皮 肉桂 三稜岩五

右十味生姜一片水煎服 莪朮

好人病

九七

療產後口舌赤爛不能飲食者兼治尊勞咳嗽吐白沫廳瘦尤甚者 鹿胎子霜一味爲末溫綇送下

療妊娠中及產後口中腫痛與口舌破爛方

升陽除濕防風傷水煎連進用之

【乳病】

婦人出乳方 乳房凝結而乳汁難出者服之大七日則湧出如神雖老

女雛乳立驗

露蜂房舞! 甘草一维

右二味細末每服五分或一錢白傷送下日再服

釀乳場 给效同前〇按此方係给被風寒侵襲而乳不出或因氣帶而

乳閉者主之

甘草 麻黄

右五味細末凡本藥用量一錢則加入白砂糖一錢以此類推茄莖 黄連 木頭燈

煎汁頻用之

療一切乳病方

逍遙散方中加貝母水煎風

療乳核初起方

療妬乳方 梓葉黑霜一味爲末白場下

甘草一味妙末蜜調塗痛處

芍藥 白芷 紫蘇 一般 大黄 順經場 冶乳癰 **) 瓜蔞仁** 治乳癰方 梭魚頭一味黑霜塗患處立效。治吹乳爛痛方 療乳痛方 大嘴鳥 精工疳妙方 【小兒雜症】 乳香 右十二味水煎服 右入味水煎服石膏 沒藥名五以藥仁 青皮経二 右五味為末清水調操患處立效. 小兒病 小兒病 沒藥 黄柏 桂枝 桔梗 甘草 苦參 皂角刺 檳榔 烏藥 金銀花 藜蘆 积 敷 粉 分 大 當韻 木香 九九

甘草。

0

楊梅皮 黄柏精等

右七味細末糊丸麻子大聽用。

豪吾散 治五疳蚖蟲驚風食傷直中諸症 阿仙藥二致朱砂八錢

右三昧爲末白湯送下。

茯苓 治小兒久喘咳嗽屬蟲者

陳皮隆 半夏

當翻

莪朮

桔梗 右九味水煎服有熱加柴胡黃芩。 枳殼 瓜菱根谷七 甘草二分

沿小兒鵝口瘡方

蜜陀僧一味水解男子塗左足心女子塗右足心

解毒方

金屬丸 解食毒及痢疾卒中風心痛一切急卒病皆用之驗 菊名石 右四味為末金箔六枚爲衣 硫黄 木香酪-伏龍肝紅十

解河豚魚毒方

解章魚毒方 牛角一味研末白锡送下及解一切魚毒甚妙

黑砂糖一味白揚送下。

解竹筍毒方 盤與干

甘草少

右二味水煎服

沿漆瘡方

世硝一味和水堡之

解生漆毒方 貫衆.

蘇葉多等

在二味水煎服或以煎汁洗患處

治霜雪傷方

香蘇散爲細末傅患處

療狂犬毒再發至危篤者方

右二味水二合煮取一合湯水不入者此湯一滴下咽則驗馬錢子 杏仁香

解粉毒方

防風 右二味水煎服 茄子根分

雑集方

解毒方 蜂集力

拾疣奇方

大麻生汁塗患處日數次即落

救溺死神方

班為黑精一味為未以竹管吹鼻中、角死腹溫氣息通者效雖氣息不

通尻穴不開者必效

療狐託人如狂亂者方

莽草葉 . 硫黃酱二 甘草一块

右三味水煎服日至七八劑溫覆取斤

治打撲金瘡即驗奇方

白朮 肉桂

黄芩

桂心

川芎

川骨

黄連

木香

大黄

右十四味調和香色炒漬百參揚用再三擺用若筋絡切斷者加櫃 芍藥 出路 良姜 甘草烯

諸腫物潰方

椰子丁子三分之一

巴豆豆

鼠尿谷

右三味為青貼瘡上

斯酒方 鸕鷀尿焼灰服方寸じ永断。

生眉毛奇方

酒糟一味黑霜麻油塗能使眉毛自生

生髮膏

生地黃 附子 山椒红 白蠟五號

右四味麻油濃煎煉如煉膏塗髮中則自生

縛血妙方 凡軍陣爭門預持之則臨時止折傷金瘡出血如神 反鼻療機 人參差二 紫檀 血蝎丝 鼹鼠黃存姓

右五味各極研末擦斑口又服方寸上即止

同煎藥方 给諸失血蛆血最妙

生地黄 續斷 人參

川芎

當歸分學

右五味水煎溫服

疵藥方 冶諸疵神效 亂髮舞 柳核宋

右等分和麻油塗之若斑口大難愈則少加輕粉即愈